



## LUBRIFICANTE OCULAR

Hialuronato de sodio obtenido por fermentación al 0,18 %. Estéril, sin conservantes.

### COMPOSICIÓN

1 ml de solución contiene 1,8 mg de hialuronato sódico, cloruro de sodio, cloruro de potasio, fosfato disódico, citrato de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio y agua para preparaciones inyectables. La solución es hipotónica.

### INDICACIONES

Síntomas y signos de ojo seco y /o daños en la superficie ocular, debido a enfermedades como la queratitis superficial, el síndrome de Sjögren o el síndrome del ojo seco primario. Para la lubricación de los ojos en caso de sensación de sequedad, quemazón o fatiga ocular, u otras dolencias menores sin importancia patológica, inducidas, por ejemplo, por el polvo, el humo, el calor seco, el aire acondicionado, el viento, el frío, o el uso prolongado de la pantalla del ordenador o de lentes de contacto (duras o blandas).

### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad individual a alguno de los componentes del producto.

### INTERACCIONES

No utilice VISMED® MULTI al mismo tiempo que otros medicamentos o productos aplicados al ojo dado que puede modificar sus efectos.

### REACCIONES ADVERSAS

En muy raras ocasiones pueden aparecer trastornos transitorios tales como irritación de la conjuntiva, sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento o sensación de quemazón en los ojos, así como visión borrosa a corto plazo.

### POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Abra el precinto de seguridad antes de la primera administración. Retire la tapa protectora. Incline la cabeza hacia atrás y coloque la punta del envase sobre el ojo que va a tratar. Tire hacia abajo el párpado inferior con uno de los dedos índices. Presione el envase y saldrá con facilidad una gota de VISMED® MULTI. Si no se recomienda lo contrario, instile 1 o 2 gotas de VISMED® MULTI en el ojo tantas veces como sea necesario. Después de parpadear, la solución se dispersará formando una capa transparente y duradera en la superficie del ojo. VISMED® MULTI también puede usarse con lentes de contacto (duras o blandas).

### PRECAUCIONES

No toque la punta del envase abierto ni tampoco la superficie del ojo con la punta del envase abierto. Coloque de nuevo la tapa después de usar VISMED® MULTI. No use VISMED® MULTI si el envase está dañado. VISMED® MULTI puede ser utilizado hasta 3 meses después del primer uso. Almacenar entre 2 °C y 25 °C. No usar VISMED® MULTI después de la fecha de caducidad indicada en el envase y en la caja. Consulte al médico si el malestar persiste con el uso de VISMED® MULTI. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS.**

### CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN

VISMED® MULTI contiene hialuronato sódico, un polímero natural que también está presente en las estructuras del ojo humano. Las características físicas particulares del hialuronato sódico le confieren a VISMED® MULTI sus propiedades viscoelásticas y de retención de agua. VISMED® MULTI crea una capa estable en la superficie del ojo que solamente se elimina lentamente al parpadear. Por lo tanto, VISMED® MULTI combina un alivio duradero con el máximo confort. VISMED® MULTI es bien tolerado debido a su composición única. VISMED® MULTI no contiene conservantes.

### PRESENTACIÓN

10 ml de solución en un envase multidosis.

Fecha última revisión de texto: Marzo 2011

